

“โรงเรียนบ้านบุเกตยามู

เฝ้าระวัง

ไข้เลือดออก



ยุ่งลายเป็นพาหะ นำโรคไข้เลือดออก
ป้องกันได้ **เริ่มที่ตัวเรา**

ข้อควรระวัง



ยุ่งลาย

กัดในเวลากลางวัน
โดยเฉพาะช่วงเช้า
และช่วงเย็น



แหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ำยุ่งลาย
มักเกิดในน้ำขัง
ตามภาชนะต่าง ๆ



อาการนำสังเกต

มีไข้สูง ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามตัว
เบื่ออาหาร อาเจียน
มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง



หากมีอาการ

ควรรีบพบแพทย์
ทันที อย่าซื้อยา
รับประทานเอง



ช่วยกันสังเกต

หากพบผู้ป่วย
ให้รีบแจ้งครู
หรือเจ้าหน้าที่

วิธีป้องกัน



เก็บ
บ้านให้สะอาด



เก็บของให้เป็นระเบียบ
ไม่ให้มีมุมอับ
ที่ยุ่งลายเกาะพัก

กำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์



กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
กว่าภาชนะที่ไม่ใช้
หรือเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน

ปิด
ฝาภาชนะให้มิดชิด



ปิดฝาโอ่งน้ำ ถังน้ำ
ภาชนะเก็บน้ำทุกชนิด
ให้มิดชิด

ปรับ
สภาพแวดล้อม



ตัดแต่งต้นไม้
ไม่ให้รกทึบ
ไม่ให้เป็นที่เกาะพัก

ป้องกัน
ตนเอง



ทายากันยุ่ง
สวมเสื้อแขนยาว
ใช้มุ้ง นอนในมุ้ง

ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน**ไข้เลือดออก**
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน



ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพของเพื่อนเรา

ร่วมด้วย
ช่วยกัน